

## DOMPERIDONE (MOTILIUM)

**Risques** : Effets indésirables cardiaques graves, risque de mort subite

**Mesures préventives** : Surveillance diarrhée et nausée (IDE), respect des contre-indications, prescription de faibles posologies (prescripteurs)

La dompéridone (Motilium®, Motilyo®, Bipéridys®, Oropéridys®, Périidys®) est indiquée dans le soulagement des symptômes de type nausées et vomissements. De nouveaux cas d'effets indésirables graves cardiaques sont rapportés pour des patients traités par la dompéridone, notamment un allongement de l'espace QT, des torsades de pointe, une arythmie ventriculaire grave voire une mort subite.

Un risque accru a été observé chez les patients âgés de plus de 60 ans, chez ceux traités par une dose quotidienne de plus de 30 mg ou en cas de prise concomitante d'autres médicaments qui allongent l'espace QT (liste en annexe 1) ou d'inhibiteurs du cytochrome P450 3A4 (liste en annexe 2).

En conséquence, il est rappelé aux professionnels de santé l'importance :

■ **De respecter impérativement les contre-indications de la dompéridone, lors de sa prescription et de sa délivrance, dans les situations suivantes :**

- chez le sujet présentant une insuffisance cardiaque ou une affection qui allonge ou qui pourrait affecter la conduction cardiaque,
- chez le sujet insuffisant hépatique modéré ou sévère,
- en cas d'association avec les médicaments allongeant l'intervalle QT ou d'inhibiteurs puissants du cytochrome P450 3A4 (voir listes en annexe)

■ **D'informer systématiquement les patients lors de la prescription et de la délivrance de la dompéridone sur :**

- la nécessité d'un avis médical avant toute l'utilisation de dompéridone (pas d'automédication),
- la nécessité de signaler aux professionnels de santé la prise de ce traitement avant toute nouvelle prescription ou délivrance d'un autre médicament.

■ **De respecter les posologies:**

- Pour les adultes et les adolescents à partir de 12 ans et de 35 kg : 10 mg jusqu'à 3 fois par jour, la dose quotidienne maximale étant de 30 mg
- La durée maximale de traitement ne doit généralement pas dépasser une semaine

ANNEXE 1

LISTE DES MEDICAMENTS RESPONSABLES D'UN ALLONGEMENT DE L'ESPACE QT

ET EXPOSANT AUX TORSADES DE POINTE

<b>NEUROLEPTIQUES</b>	
CLOPIXOL	zuclopenthixol
DIPIPERON	pipampérone
DOGMATIL / SYNEDIL	sulpiride
FLUANXOL	flupentixol
HALDOL fortes doses	halopéridol
LARGACTIL	chlorpromazine
LEPONEX	clozapine
LOXAPAC	loxapine
MODECATE	fluphénazine
NEULEPTIL	propériciazine
NOZINAN	levomépromazine
PIPORTIL	pipotiazine
RISPERDAL	rispéridone
SEMAP	penfluridol
SOLIAN	amisulpride
TERCIAN	cyaménazine
TIAPRIDAL	tiapride
ZYPREXA	olanzapine
ZYPADHERA	olanzapine
<b>ANTIDEPRESSEURS</b>	
ANAFRANIL	clomipramine
DEFANYL	amoxapine
EFFEXOR	venlafaxine
LAROXYL	amitryptiline
LUDIOMIL	maprotiline
QUITAXON	doxépine
SEROPRAM / SEROPLEX	citalopram, escitalopram
SURMONTIL	trimipramine
TOFRANIL	imipramine
<b>ANTIEPILEPTIQUES</b>	
INOVELON	rufinamide
TROBATL	rétigabine
<b>AUTRES PSYCHOTROPES</b>	
METHADONE	méthadone
TERALITHE	lithium
<b>ANTIARYTHMIQUES</b>	
CIPRALAN / EXACOR	cibenzoline
CORDARONE	amiodarone
CORVERT	ibutilide
FLECAÏNE	flécaïnade
MULTAQ	drodénarone
QUINIMAX	quinidine
RYTHMODAN / ISORYTHM	disopyramide
SERECOR	hydroquinidine
SOTALIX	sotalol
UNICORDIUM	bépridil
<b>ANTI-ISCHEMIQUES</b>	
VINCAMINE	vincamine

<b>PARASYMPATHOLYTIQUES</b>	
DIPHEMANIL	diphémanil méthylsulfate
<b>ANTIISTAMINIQUES</b>	
KESTIN	ébastine
MIZOLLEN	mizolastine
TELFAS	fexofénadine
<b>ANTI-INFECTIEUX</b>	
ERYTHROMYCINE IV	érythromycine
HALFAN	halofantine
LARIAM	méfloquine
PENTACARINAT	pentamidine
SURQUINA / QUININE / QUINIMAX	quinine
IZILOX (et autres fluoroquinolones)	moxifloxacine
ROVAMYCINE	spiramycine
SYNERCID	dalfopristine + quinupristine
TRIFLUCAN	fluconazole
VFEND	voriconazole
NOXAFIL	posaconazole
<b>UROLOGIE</b>	
CERIS	trospium
LEVITRA	vardénafil
<b>ANTIEMETIQUES</b>	
MOTILIAM / MOTILYO / PERIDYS	dompéridone
<b>ANTIRETROVIRAUX</b>	
REYATAZ	atazanavir
PREZISTA	darunavir
INVIRASE	saquinavir
KALETRA	lopinavir
EDURAN	rilpivirine

## ANNEXE 2

### LISTE DES MEDICAMENTS INHIBITEURS DE L'ISOENZYME CYP 3A4 du CYTOCHROME P450

<b>ANTIEPILEPTIQUES</b>	
DIACOMIT	stiripentol
VIMPAT	lacosamide
<b>ANTIDEPRESSEURS</b>	
PROZAC	fluoxétine
<b>MEDICAMENTS CARDIOVASCULAIRES</b>	
CORDARONE	amiodarone
ISOPTINE	vérapamil
MULTAQ	drodénarone
TILDIEM	diltiazem
<b>ANTI-INFECTIEUX</b>	
DYNABAC	dirithromycine
EGATEN	triclabendazole
ERY, ERYTHROCINE	erythromycine
JOSACINE	josamycine
KETEK	télithromycine
NAXY, ZECLAR	clarithromycine
RULID, CLARAMID	roxithromycine

SYNERCID	dalfopristine + quinupristine
ZYTHROMAX, AZADOSE	azithromycine
TRIFLUCAN	fluconazole
VFEND	voriconazole
NOXAFIL	posaconazole
NIZORAL	ketoconazole
<b>ANTIRETROVIRAUX</b>	
REYATAZ	atazanavir
PREZISTA	darunavir
INVIRASE	saquinavir
KALETRA	lopinavir
EDURAN	rilpivirine
QUITAXON	doxépine
<b>ANTI-H2</b>	
TAGAMET	cimétidine
<b>ANTIÉPILEPTIQUES</b>	
DIACOMIT	stiripentol
VIMPAT	lacosamide