

LITHIUM

THERALITHE

Risque : Marge thérapeutique étroite → risque de surdosage

Mesures préventives :

*Surveillance lithiémie et fonction rénale : contrôle réguliers du taux sanguin (tous les 2 à 3 mois) à la même heure le matin avant la prise du médicament

*Ne pas faire de régime hyposodé ou désodé (augmentation de la lithiémie)

*Association déconseillée (augmentation de la lithiémie):

- Carbamazépine (TEGRETOL),
- Chlorpromazine (LARGACTIL),
- fluphénazine (MODECATE),
- halopéridol (HALDOL),
- ARAII (APROVEL, ATACAND, NISIS, PRITOR, HYZAAR, FORTZAAR, COTAREG, COAPROVEL, HYTACAND)
- AINS
- diurétiques
- IEC (RENITEC, CORENITEC, JUSTOR, ZESTRIL, ZESORETIC, ODRIK, KOREC, ACUILIX, BRIEM, CIBADREX, FOZITEC, COVERSYL, PRETERAX, BIPRETERAX, TYRIATEC, COTRIATEC, MOEX, LOPRIL, CAPTOLANE, CAPTEA, ECAZIDE, ZOFENIL)

* Surveillance des signes de surdosage : nausées, tremblements, soif, troubles de l'équilibre