

Analgésiques morphiniques majeurs

(Antalgiques du palier III)

Risques : Erreur de calcul de dose, risque de surdosage, risque de syndrome de sevrage

Morphiniques concernés

- Morphine par voie injectable (SC et IV)
- Morphine par voie orale à libération immédiate (ActiSkenan) et libération prolongée (Skenan LP)
- Fentanyl par voie transdermique (Durogesic)

MESURES PREVENTIVES

1 - DUROGESIC

IDE

- S'assurer du jour de la pose
- Appliquer et changer méthodiquement le dispositif (se laver les mains après l'application et le retrait, enlever systématiquement le dispositif usagé avant d'en mettre un nouveau...)
- Eviter certains gestes (ne pas couper, ne pas plier)
- Ne pas oublier le patch sur le patient (risque de surdosage)
- Retour du patch usagé en pharmacie

Prescripteurs

- Prescription sur ordonnance sécurisée avec indication en toutes lettres du nombre d'unités thérapeutiques par prise, du nombre de prises, du dosage
- Prendre garde aux différents dosages existants
- Ne pas initier un traitement antalgique d'emblée par des dispositifs transdermiques
- Prendre garde aux différents dosages existants
- Prescrire impérativement en "rythme" sur PHARMA : 1 jour tous les 3 jours
- Eviter l'arrêt brutal par une diminution progressive des doses

2 - AUTRES MORPHINIQUES

IDE : Retour des ampoules vides de morphine à la pharmacie

Prescripteurs

- Prescription sur ordonnance sécurisée avec indication en toutes lettres du nombre d'unités thérapeutiques par prise, du nombre de prises, du dosage
- Prendre garde aux différents dosages existants
- Eviter l'arrêt brutal par une diminution progressive des doses pour éviter un syndrome de sevrage (anxiété, irritabilité, frissons, mydriase, bouffées de chaleur, sudation, larmoiement, rhinorrhée, nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhées, arthralgies)

medicaments antaligiques.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

5 / 7 93,2%

Tools Sign Comment

ANTALGIQUES DU PALIER III (OPIACÉS FORTS)						
	Substances	Délai d'action	Pic d'action	Intervalle d'administration	Précautions d'emploi communes	Effets indésirables
VOIE ORALE	Sulfate de Morphine <i>Actiskénan®</i> gel. à 5, 10, 20, et 30 mg (ou <i>Sévrédol®</i> cps à 10 ou 20 mg)	20 à 30'	1 à 2 heures	1 à 6 heures	Insuffisance respiratoire décompensée Insuffisance hépatocellulaire sévère Traumatisme crânien Allergie à la Morphine Alcoolisme aigu Delirium tremens	<i>Sédation</i> <i>Rétention d'urine</i> <i>Nausées</i> <i>Vomissements</i> <i>Hyperthermie</i> <i>Pruirit</i> <i>Délire</i> <i>Hallucinations</i>
	Skénan® LP gel. à 10, 30, 60, 100 et 200 mg (ou <i>Moscontin®</i> cps à 10, 30, 60, 100 et 200 mg)	30 à 60'	2 à 4 heures	8 à 12 heures		
	Kapanol® LP gel. à 20, 50 et 100 mg	30 à 60'	8 à 10 heures	24 heures		
	Hydromorphone <i>Sophidone® LP</i> gel à 4, 8, 16 et 24 mg	30 à 60'	2 à 4 heures	12 heures		
	Oxycodone <i>Oxynorm®</i> gel 5, 10, 20 mg <i>Oxycontin® LP</i> cps à 10, 20, 40 et 80 mg	20 à 30' 1 à 2 heures	1 à 2 heures 2 à 4 heures	1 à 6 heures 12 heures		
VOIE IVL, SC	Chlorhydrate de Morphine	10 à 60'	1 à 2 heures	1 à 6 heures	Épilepsie non traitée	<i>Confusion</i>
VOIE TRANSDERMIQUE	Fentanyl <i>Durogésic®</i> patchs à 25, 50, 75 et 100 µg/h	4 à 12 heures	24 à 72 heures	48 à 72 heures		

www.antalvite.fr

11,69 x 8,26 in

FR 09:56 11/07/2014

medicaments antalgiques.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

7 / 7 93,2%

Tools Sign Comment

TABLEAU D'ÉQUIANALGÉSIE DES MORPHINIQUES

	Facteur de conversion	Voie Orale	Voie S/C	Voie IVL	Exemples
Morphine (Skénan®, Moscontin®, Chlorhydrate de Morphine)	1 (opiacé de référence)	60 mg PO ≈ 30 mg SC ≈ 20 mg IVL			
Hydromorpnone (Sophidone® LP)	8		8 mg		4 mg de Sophidone® ≈ 32 mg de Skénan LP®
Paracétamol-Dextropoxyphène (Di-Antalvic®) (30 mg de dextropoxyphène / gel)	1/6		360 mg		6 gel de Di-Antalvic® ≈ 30 mg de Skénan LP®
Paracétamol-Codéine (Dafalgan codéine®, Efferalgan codéiné®) (30 mg de codéine + 500 mg de paracétamol / cp) (Codoliprane®) (20 mg de codéine + 400 mg de paracétamol / cp)	1/6		360 mg		6 cps de Dafalgan-codéine® à 500 mg ≈ 30 mg de Skénan LP®
Dihydrocodéine (Dicodin®) (60 mg de codéine / cp)	1/3		180 mg		1 cp de Dicodin® LP à 60 mg ≈ 20 mg de Skénan LP®
Tramadol per os (Topalgic®, Contramal®)	1/5		300 mg		1 cp de Topalgic® à 50 mg ≈ 10 mg de Skénan LP®
Fentanyl transdermique (Durogésic®)	2,4		25 µg/h		1 patch de Durogésic® à 50 µg/h ≈ 120 mg de Skénan LP®/jour
Oxycodone (Oxycontin® LP)	2		30 mg		1 cp d'Oxycontin® LP à 10 mg ≈ 20 mg de Skénan LP®

www.antalvite.fr

FR 09:55 11/07/2014