

NEUROLEPTIQUES

Sont concernés les neuroleptiques injectables à action prolongée (NAP), les neuroleptiques injectables à surveillance particulière, le LEPONEX

NAP

Risques :

- oubli de réaliser une injection
- erreur sur la date de l'injection
- erreur d'équivalence
- confusion entre Clopixol AP (action prolongée) et Clopixol ASP (action semi-prolongée)
- Administration de Clopixol ASP sans respecter un intervalle de 48-72 h entre 2 injections

Mesures préventives :

Les NAP sont à prescrire uniquement sur Pharma (afin d'éviter tout oubli ou double prescription). La prescription sur CIMAISE est proscrite.

Vigilance à la lecture de l'étiquetage. Conserver l'emballage individuel avec identification patient et date d'injection

S'assurer de la traçabilité de la dernière injection (sur le logiciel Pharma, livret Janssen, agenda ou autre tableau de suivi)

Olanzapine (Zyprexa®) 10 mg injectable IM

Risque : Dépression cardio-respiratoire, hypotension et bradycardie parfois mortelles

Mesures préventives : Uniquement en instauration de traitement (3 jours max consécutifs) lorsque la voie orale n'est pas adaptée

Zypadhera susp inj LP (voie IM)

Risque : syndrome post-injection dans l'heure qui suit l'injection (sédation, coma, délirium, symptômes extrapyramidaux, anxiété, ataxie, vertiges, confusion, hypertension)

Mesures préventives : Hospitalisation obligatoire du patient

*Administration par un professionnel de santé formé

*Surveillance post-injection pendant au moins 3 heures

*Patient à reconduire à son domicile par une tierce personne

Leponex (clozapine)

Risque : agranulocytose, neutropénie

Mesures préventives :

*Surveillance stricte de la formule sanguine (globules blancs et polynucléaires neutrophiles)
NFS hebdomadaire les 18 premières semaines de traitement puis mensuelles.

*Reprise du traitement à dose progressive si interruption supérieure à 2 jours

*Si interruption de plus de 3 jours après plus de 18 semaines de traitement, recontrôler la formule sanguine de façon hebdomadaire (voir VIDAL)

*Ne jamais réexposer les patients chez lesquels la Clozapine a été arrêtée suite à une baisse soit en GB soit en PNN

*Carnet de suivi obligatoire pour chaque dispensation