



REACTION ALLERGIQUE GRAVE, ANAPHYLAXIE TROUSSE D'URGENCE

Référence : PT/URG/007-A

Page : Page 1 sur 2

Date de validation : 23/10/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 30/10/2013

Edition : 1ère

Objet :

Ce protocole a pour but de définir les modalités de prise en charge de l'allergie grave dans les structures de soins de pédopsychiatrie.

Mots clés : Allergènes / Allergie grave / Anaphylaxie / Celestene / Enfant / Pédo-psychiatrie / Signes cliniques initiaux / Urgence /

Documents de référence

- Critère HAS (V2010) : 18b
- Sémiologie et thérapeutiques médicales

Validation

Rédaction : Dr Elisabeth DUPUIS Chef de service Pédiatrie – CHUM, Hôpital Trinité
Dr Armenak MKHITARYAN Praticien Hospitalier – Pôle de pédopsychiatrie

Approbation : Commission Médicale d'Établissement (CME)
Direction des Soins

Validation : Directeur de la Qualité et de la Gestion des Risques

Date d'application : 30/10/2013

Diffusion

Pour application :

- l'ensemble du personnel soignant et éducatif
- Structures de soins du pôle de psychiatrie infanto-juvénile

Pour classement :

- Commission Médicale d'Établissement (CME)
- Direction du Service des Soins
- Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques

Evaluation :

-



REACTION ALLERGIQUE GRAVE, ANAPHYLAXIE TROUSSE D'URGENCE

Référence : PT/URG/007-A

Page : Page 2 sur 2

Date de validation : 23/10/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 30/10/2013

Edition : 1ère

DEFINITION

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave induite par l'exposition à une substance allergène.

1. Signes Cliniques initiaux

Après exposition à l'allergène :

- *Urticaire, démangeaisons diffuses*
- *Et/ou rhinite, larmolement avec prurit nasal ou oculaire*
- *Œdème du visage (yeux, lèvres, cou) ou des extrémités*

1.1 Conduite à tenir

- ✓ *Ecarter l'allergène,*
- ✓ *Appeler le 15*
- ✓ *CELESTENE 10 gouttes par kg per os*

2. Signes de gravité

- *Gêne respiratoire avec impression d'étouffer*
- *Chute de tension, malaise avec perte de connaissance*

2.1 Conduite à tenir

- ✓ *Appeler le 15*
- ✓ *Injecter ANAPEN en IM (dans la cuisse) 0,15 mg/0,3ml*
(2 ampoules d'emblée si poids > 50kg)
- ✓ *Noter l'heure d'injection*
- ✓ *Conduire l'enfant aux urgences*
- ✓ *Prévenir les parents*
- ✓ *Prévenir le médecin de la structure*
- ✓ *Rédiger un compte-rendu dans le dossier médical de l'enfant.*