



PRISE EN CHARGE DE LA CRISE D'ASTHME TROUSSE D'URGENCE

Référence : PT/URG/008-A

Page : Page 1 sur 2

Date de validation : 02/12/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 22/01/2014

Edition : 1ère

Objet :

Ce protocole a pour but de définir les modalités de prise en charge de l'enfant présentant une crise d'asthme. Son application concerne l'ensemble des personnels soignants et éducatif intervenant dans les structures de soins du pôle de pédopsychiatrie.

Mots clés : Asthme / Crise / Difficultés respiratoires / Enfant / Pédo-psychiatrie / Urgence /

Documents de référence

- Critère HAS (V2010) : 18b
- Sémiologie et thérapeutiques médicales

Validation

Rédaction : Dr Elisabeth DUPUIS Chef de service Pédiatrie – CHUM, Hôpital Trinité
Dr Armenak MKHITARYAN Praticien Hospitalier – Pôle de pédopsychiatrie

Approbation : Commission Médicale d'Etablissement (CME)
Direction des Soins

Validation : Directeur de la Qualité et de la Gestion des Risques

Date d'application : 22/01/2014

Diffusion

Pour application :

- l'ensemble du personnel soignant et éducatif
- Structures de soins du pôle de psychiatrie infanto-juvénile

Pour classement :

- Commission Médicale d'Etablissement (CME)
- Direction du Service des Soins
- Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques

Evaluation :

-



PRISE EN CHARGE DE LA CRISE D'ASTHME TROUSSE D'URGENCE

Référence : PT/URG/008-A

Page : Page 2 sur 2

Date de validation : 02/12/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 22/01/2014

Edition : 1ère

A. DEFINITION

La crise d'asthme est une crise de Dyspnée expiratoire (gêne à l'expiration).

Le plus souvent antécédents connus d'asthme.

1. Signes cliniques initiaux :

- Difficultés à l'expiration avec sifflements parfois audibles

2. Signes de gravité:

- Cyanose,
- Agitation
- Difficulté à parler

CONDUITE A TENIR

- ✓ Installer l'enfant en position assise
- ✓ Administrer à la chambre d'inhalation 2 bouffées de VENTOLINE
 - Si signes de gravité ou si gêne persistante :
- ✓ Administrer :
 - 1 bouffée pour 2 kg (*soit 5 bouffées pour un enfant de 10 kg*) avec un maximum de 10 bouffées.
 - CELESTENE 10 gouttes / kg
- ✓ Appeler le SAMU
- ✓ Si nécessaire, conduire l'enfant aux urgences
- ✓ Informer les parents
- ✓ Rédiger un compte-rendu dans le dossier.