



C.H.C

TROUSSE D'URGENCE

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE TROUBLES DIGESTIFS AIGUS (diarrhée, vomissement, nausées,)

Référence :

Pages : 1 sur 2

Date de validation :

Date de remise à jour :

Date de diffusion :

Edition :

Objet :

Ce protocole a pour but de définir les modalités de prise en charge des troubles digestifs aigus de l'enfant dans les structures de la pédopsychiatrie

Mots clés :

diarrhée, vomissement, nausées

Documents de référence

Sémiologie et thérapeutiques médicales

Validation

Rédaction :

- | | |
|-------------------------|--|
| - Dr Elisabeth DUPUIS | Chef de service Pédiatrie
CHUM - Hôpital de trinité |
| - Dr Armenak MKHITARYAN | Praticien hospitalier
Pôle pédopsychiatrie |
| - | |

Validation :

Date d'application :

Diffusion

Pour application :

- toutes les structures extrahospitalières du pôle
- tout personnel soignant et éducatif

Pour classement :

- Service de soins et unités fonctionnelles du pôle
PEDOPSYCHIATRIE



TROUSSE D'URGENCE	
PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE TROUBLES DIGESTIFS AIGUS (diarrhée, vomissement, nausées,)	
Référence :	Pages : 2 sur 2
Date de validation :	Date de remise à jour :
Date de diffusion :	Edition :

A. DEFINITION

1. Signes cliniques initiaux

1.1. Vomissement isolé

Un vomissement isolé ou une selle liquide isolée n'ont pas de caractère de gravité.

Vérifier :

- L'absence de fièvre
- L'absence de traumatisme crânien récent (*pour les vomissements*)

CONDUITE A TENIR

- ✓ Mettre l'enfant au repos et au calme
- ✓ Lui prendre la température
- ✓ Lui proposer (*sans forcer*) à boire par petites quantités (*1/4 de verre*) d'eau ou boissons sucrées non gazeuses (*on peut utiliser le COCA, mais enlever les bulles*)
- ✓ Informer les parents

1.2. Si les vomissements persistent de façon incoercible :

- ✓ Supprimer toute alimentation solide,
- ✓ Administrer du VOGALENE solution buvable 0,1% (*1 dose selon le poids de l'enfant*), directement avec une seringue graduée ou au verre en mélangeant avec une petite quantité d'eau.
- ✓ noter la dose et l'heure d'administration sur le cahier de liaison de l'enfant

1.3. En cas de diarrhée profuse :

- ✓ Supprimer toute alimentation solide,
- ✓ Continuer l'hydratation par la bouche par petites quantités (*1/4 de verre*) toutes les 1/2 heure
- ✓ Demander aux parents de récupérer l'enfant rapidement et consulter le médecin traitant ou les urgences pédiatriques (*noter la température, la fréquence des vomissements, des selles et la quantité de liquide que l'enfant a pu absorber sans vomir*).