



**PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DIGESTIFS AIGUS
(DIARRHÉE , VOMISSEMENT, NAUSEES)
TROUSSE D'URGENCE**

Référence : PT/URG/009-A

Page : Page 1 sur 2

Date de validation : 02/12/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 22/01/2014

Edition : 1ère

Objet :

Ce protocole a pour but de définir les modalités de prise en charge des troubles digestifs aigus de l'enfant, dans les structures de soins du pôle de pédopsychiatrie.

Mots clés : Diarrhée / Enfant / Nausée / Pédo-psychiatrie / Urgence / Vomissement /

Documents de référence

- Critère HAS (V2010) : 18b
- Sémiologie et thérapeutiques médicales

Validation

Rédaction : Dr Elisabeth DUPUIS Chef de service Pédiatrie – CHUM, Hôpital Trinité
Dr Armenak MKHITARYAN Praticien Hospitalier – Pôle de pédopsychiatrie

Approbation : Commission Médicale d'Etablissement (CME)
Direction des Soins

Validation : Directeur de la Qualité et de la Gestion des Risques

Date d'application : 22/10/2014

Diffusion

Pour application :

- l'ensemble du personnel soignant et éducatif
- Structures de soins du pôle de psychiatrie infanto-juvénile

Pour classement :

- Commission Médicale d'Etablissement (CME)
- Direction du Service des Soins
- Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques

Evaluation :

-



**PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DIGESTIFS AIGUS
(DIARRHÉE , VOMISSEMENT, NAUSEES)
TROUSSE D'URGENCE**

Référence : PT/URG/009-A

Page : Page 2 sur 2

Date de validation : 02/12/2013

Date de remise à jour :

Date de diffusion : 22/01/2014

Edition : 1ère

A. DEFINITION

1. Signes cliniques initiaux

1.1. Vomissement isolé

Un vomissement isolé ou une selle liquide isolée n'ont pas de caractère de gravité.

Vérifier :

- L'absence de fièvre
- L'absence de traumatisme crânien récent (*pour les vomissements*)

CONDUITE A TENIR

- ✓ Mettre l'enfant au repos et au calme
- ✓ Lui prendre la température
- ✓ Lui proposer (*sans forcer*) à boire par petites quantités (*1/4 de verre*) d'eau ou boissons sucrées non gazeuses (*on peut utiliser le COCA, mais enlever les bulles*)
- ✓ Informer les parents

1.2. Si les vomissements persistent de façon incoercible :

- ✓ Supprimer toute alimentation solide,
- ✓ Administrer du VOGALENE solution buvable 0,1% (*1 dose selon le poids de l'enfant*), directement avec une seringue graduée ou au verre en mélangeant avec une petite quantité d'eau.
- ✓ noter la dose et l'heure d'administration sur le cahier de liaison de l'enfant

1.3. En cas de diarrhée profuse :

- ✓ Supprimer toute alimentation solide,
- ✓ Continuer l'hydratation par la bouche par petites quantités (*1/4 de verre*) toutes les ½ heure
- ✓ Demander aux parents de récupérer l'enfant rapidement et consulter le médecin traitant ou les urgences pédiatriques (*noter la température, la fréquence des vomissements, des selles et la quantité de liquide que l'enfant a pu absorber sans vomir*).